

	Hépatite A	Hépatite B	Hépatite C
Vaccination obligatoire	Non concerné.	Dès l'entrée en formation des professions médicales et paramédicales.	Actuellement il n'existe aucun vaccin.
Vaccination recommandée	Personnel des établissements médico-sociaux, structures d'accueil d'enfants, professionnels chargés du traitement des eaux usées et des égouts.	Personnes susceptibles d'être en contact direct avec des patients et / ou d'être exposées au sang et autres produits biologiques.	
Traitement	Conseils hygiéno-diététiques et traitement symptomatique si nécessaire.	L'organisme se défend seul. Parfois un traitement peut être nécessaire.	Selon l'évolution de la maladie.
Déclaration accident du travail	Oui	Oui	Oui
Maladie professionnelle du régime général	Oui	Oui	Oui

Pour toute hépatite confirmée, n'hésitez pas à avertir votre service de santé au travail.

Attention : en cas d'accident d'exposition au sang (AES) pour les hépatites B et C, il est nécessaire de suivre la procédure pour une prise en charge optimale (cf. plaquette AES).



Action
Santé
Travail

Votre partenaire Santé - Travail

LES HÉPATITES A, B, C

Comment les différencier ?
Comment les prévenir ?

Les hépatites, les connaître pour mieux les prévenir.



Les hépatites sont des maladies virales qui touchent le foie par différents modes de transmission.

	Mode de transmission	Symptômes	Diagnostic / dépistage	Prévention
Hépatite A	<ul style="list-style-type: none"> - Eaux ou aliments contaminés (crustacés, coquillages, viandes crues/mal cuites, fruits et légumes). - Conditions d'hygiène déficientes. - Objets souillés par des matières fécales infectées. - Pratiques sexuelles (orales-anales). 	<p>La maladie passe souvent inaperçue, mais même sans symptôme la personne est parfois contagieuse.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Se laver les mains en entrant et en sortant des WC ou avant la préparation d'un repas, privilégier de l'essuie-mains à usage unique. - Laver, peler, cuire les fruits et les légumes. - Porter des gants dans certaines professions : soins aux personnes, contact eaux usées (égoutiers, agents d'assainissements, travaux publics...). - Boire l'eau en bouteille (voyageurs en zones à risque).
Hépatite B	<ul style="list-style-type: none"> - Contact avec des liquides et sécrétions biologiques contaminés par : <ul style="list-style-type: none"> - La voie sexuelle. - La voie sanguine. - Contact sur peau lésée ou muqueuse avec des selles ou urines contaminées par du sang. - De la mère à l'enfant lors de l'accouchement et au cours de l'allaitement. 	<p>Les symptômes peuvent être :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fièvre. - Douleurs au foie. - Douleurs articulaires. - Vomissements. - Fatigue. - Jaunisse. - Urines foncées. - Perte d'appétit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Le diagnostic est difficile au début de la maladie car elle passe souvent inaperçue. - Une prise de sang permet d'affirmer le diagnostic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se laver les mains. - Porter des gants. - Utiliser des containers à aiguilles. - Utiliser des préservatifs. - Ne pas partager les rasoirs, brosses à dents, coupe-ongles, sticks à lèvres.
Hépatite C	<ul style="list-style-type: none"> - Contact avec des liquides et sécrétions biologiques contaminés par voie sanguine. - Contact sur peau lésée ou muqueuse avec des selles ou urines contaminées par du sang. - De la mère à l'enfant lors de l'accouchement et au cours de l'allaitement. 	<p>Contrairement à l'hépatite A, les hépatites B et C peuvent évoluer vers des hépatites chroniques.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Se laver les mains. - Porter des gants. - Utiliser des containers à aiguilles. - Ne pas partager les rasoirs, brosses à dents, coupe-ongles, sticks à lèvres.